

Hoe prikt u Pregnyl®?

Een injectie Pregnyl® maakt u zelf klaar, waarna u het middel inspuit in de buikplooi. Deze folder beschrijft de prikinstructie voor een injectie met 5.000 eenheden Pregnyl®.

Wat moet u doen voorafgaand aan de injectie?

-U haalt het doosje met Pregnyl® en Oplosmiddel uit de koelkast om op kamertemperatuur te komen.

-U legt klaar:

- het 2 ml-spuitje;
- de 2 naaldjes;
- de naaldenemmer.



- U wast uw handen met zeep.

Het klaarmaken van de injectie

- Neem het spuitje uit de verpakking en zet de grootste naald op het spuitje (goed aandrukken).



- Haal de gele en groene dop van de ampullen Pregnyl® en oplosmiddel af en zet de ampullen voor u neer.



Oplossen

- Zuig het oplosmiddel op.
- Spuit de vloeistof in de ampul met Pregnyl® poeder. Het poeder lost meteen op.



- Zuig de oplossing weer op in het spuitje.



- U verwijdert de naald en gooit deze in de naaldenemmer.



Ontluchten

- Zet het kleine naaldje op het spuitje en druk goed aan.

-Tik de lucht in de richting van het naaldje omhoog.




- Duw de stamper langzaam omhoog tot er een druppeltje vloeistof uit het naaldje komt. Het is niet erg als er wat lucht in het spuitje achterblijft.



De injectie

- Pak een huidplooi van de buik. Het is niet nodig op de huid eerst te ontsmetten.

- Neem de spuit en prik snel, loodrecht in de huid. Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit. Druk de spuit in drie à vijf seconden helemaal leeg. Trek daarna de naald loodrecht en snel weer uit de huid.



- Soms bloedt het een beetje. Dit is niet erg: de Pregnyl® is er niet uitgebloed. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.

- De injectiespuit met naald doet u in de naaldenemmer. Een volle emmer klikt u dicht en levert u in bij uw apotheek.



Onverwacht te weinig injecties

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad injecties nauwgezet te controleren.

Het HagaZiekenhuis heeft geen injecties op voorraad. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan direct contact met ons op onder vermelding van uw (meisjes)naam, initialen, patiëntnummer en geboortedatum. Hebt u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het HagaZiekenhuis via 070-2100000.

Let op: de apotheek binnen het HagaZiekenhuis is gesloten in het weekend.

